

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO

FECHA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO _____

NOMBRE DEL PACIENTE:

(Nombre y dos apellidos o etiqueta de identificación)

FECHA DE NACIMIENTO _____ RUT: _____

NOMBRE DEL MÉDICO: _____ RUT: _____

(Letra Legible, puede utilizar TIMBRE)

PROCEDIMIENTO, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O TRATAMIENTO

(NO utilizar ABREVIATURAS)

HIPOTESIS DIAGNÓSTICA _____

(NO utilizar ABREVIATURAS)

I.-DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE DESCOMPRESIÓN DEL SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, de su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla.

Puede usted revocar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente.

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto.

LO QUE USTED DEBE SABER

EN QUÉ CONSISTE Y PARA QUÉ SIRVE

El síndrome compartimental es una situación de extrema urgencia que ocurre por aumento de presión dentro de un compartimento muscular cerrado y no distensible. Esto provoca una disminución de la llegada de sangre a esa zona que en pocas horas puede causar lesiones irreversibles a los músculos y nervios de ese compartimento.

Puede afectar a miembros superiores e inferiores.

La intervención consiste en la apertura en toda la longitud del compartimento afectado.

El propósito principal de la intervención es disminuir la presión del compartimento muscular y, si es posible, tratar la causa que lo haya provocado.

CÓMO SE REALIZA

La intervención se realiza abriendo la piel y las fascias (capas de tejido que mantienen cerrado el compartimento). Dependiendo de las causas que lo hayan provocado y del grado de afectación que presenten los músculos, vasos y nervios, puede ser necesario extirpar zonas más o menos amplias de músculo muerto, o realizar reconstrucciones vasculares inmediatas.

La operación necesita anestesia general, o de la extremidad que se va a intervenir. El anestesista estudiará su caso y le informará del tipo de anestesia más adecuada para usted.

Por lo general se utilizará medicación para disminuir el riesgo de infección o de trombosis.

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ

- Durante un tiempo presentará molestias debidas a la cirugía y a las curaciones repetidas.
- Durante unos días necesitará reposo estricto con el miembro intervenido en alto.
- La intervención requiere la apertura completa en toda su longitud de los compartimentos musculares afectados, por lo que quedarán cicatrices poco estéticas a lo largo de toda la zona afectada.
- Después de esta cirugía de descompresión será necesario repetir periódicamente curaciones bajo anestesia de la herida quirúrgica, para limpiarla. Suelen ser necesario seguir extirpando las zonas musculares necróticas (muertas).
- El cierre definitivo de la piel puede necesitar que se realicen injertos.
- Según el tipo de operación y de anestesia, puede necesitar una sonda de orina durante algunos días.
- Debido a la pérdida de sangre provocada por la lesión, por la operación y las curas, puede presentarse anemia que necesite transfusiones o suplementos de hierro.

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ

La cirugía de descompresión es la única posibilidad de disminuir la presión en el compartimento y minimizar las secuelas de este grave síndrome.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO

El diagnóstico de un síndrome compartimental puede considerarse una situación de emergencia. Si no se realiza la cirugía, casi con seguridad quedarán secuelas musculares y neurológicas irreversibles y de muy difícil tratamiento (parálisis, atrofas musculares graves, contracturas y deformidad del miembro) y existe riesgo de que las zonas lesionadas se infecten de forma secundaria.

QUÉ RIESGOS TIENE

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

- LOS MÁS FRECUENTES:

- Anemia postoperatoria que puede necesitar una transfusión sanguínea.
- Pérdida de movilidad de las articulaciones cercanas y atrofia de los músculos próximos.
- Complicaciones de la cicatriz: Existe el riesgo de que la cicatriz de la operación sea dolorosa o poco estética.
- Necrosis cutánea: La pérdida del riego sanguíneo de la piel próxima a la herida puede hacer necesaria la extirpación de zonas de piel muerta y su cobertura con injertos.
- La lesión muscular y nerviosa puede ser irreversible. A pesar de la intervención, pueden quedar lesiones musculares y nerviosas irrecuperables que necesiten intervenciones paliativas para mejorar la función del miembro.

- LOS MÁS GRAVES:

- Tras la descompresión se liberan a la circulación sanguínea sustancias producidas por los músculos dañados que pueden afectar al corazón, alterar la tensión o dificultar la función de los riñones. Por estos motivos puede necesitar medicación u otros procedimientos específicos.
- La gravedad de las lesiones puede requerir en un segundo tiempo la amputación del miembro.
- Infección: Toda cirugía tiene riesgo de infección. La infección puede ser superficial (localizada justo bajo la piel) o profunda (afecta a músculos y hueso). Si esto ocurre, se realizará tratamiento con antibióticos y se evaluará la necesidad de otros procedimientos (curaciones locales, limpieza de la herida en el quirófano, colocación de antibióticos en el lugar de la infección).
- Hemorragia: Durante la intervención pueden lesionarse vasos sanguíneos cercanos. A veces, es necesaria una segunda operación para frenar el sangrado.
- Trombosis Venosa y Tromboembolismo Pulmonar: Formación de trombos en las venas de la extremidad provocando edema y dolor. Estos trombos pueden desprenderse y generar complicaciones pulmonares agudas con consecuencias graves y riesgo de muerte.
- Distrofia simpático-refleja: En las zonas próximas al sitio de una operación puede producirse una pérdida de movilidad en las articulaciones, descalcificación de los huesos, inflamación, dolor, alteraciones de temperatura, sensibilidad, coloración y sudoración. Esta situación puede incapacitarle y necesitar tratamiento médico y rehabilitador prolongado.
- Lesión de nervios de la extremidad que puede provocar distintos grados de pérdida de sensibilidad o parálisis. Esta lesión puede ser temporal o definitiva.

- Lesión de un vaso sanguíneo principal de la extremidad que necesite intervenciones de cirugía vascular para su reparación. Si la lesión es irreparable puede requerir la amputación de la extremidad.

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:

La descompresión de un síndrome compartimental puede no ser conveniente cuando la intervención o la anestesia supongan un riesgo vital inaceptable para el paciente.

OTROS MOTIVOS PARA LOS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.

- Se podrían tomar muestra para biopsia y otras necesarias que podrían requerirse para estudiar su caso, las que deben ser procesadas por nuestros laboratorios de anatomía patológica en convenio.

II.- CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento del/de la representante legal.

En el caso del MENOR DE EDAD, el consentimiento lo darán sus representantes legales, aunque el menor siempre será informado de acuerdo a su grado de entendimiento.

En caso de menores de edad o pacientes sin capacidad de otorgar consentimiento

Apoderado: _____

Rut: _____

Firma paciente o apoderado

Firma del Médico

=====

No autorizo o revoco la autorización para la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello pueda derivarse para la salud o la vida, de forma libre y consciente.

En caso de DENEGACION O REVOCACION

Firma Paciente o apoderado

Firma Médico